



ADVANCED SUBSIDIARY (AS)
General Certificate of Education
January 2011

Uimhir Lárionaid

71

Uimhir larrthóra

Ceimic
Aonad Measúnaithe AS 1
ag measúnú
Bunchoincheapa i gCeimic Fhisiceach
agus Orgánach
[AC111]



DÉARDAOIN 13 EANÁIR, MAIDIN

AM

1 uair 30 nóiméad.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir larrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Freagair **gach ceann** de na **sé** cheist **déag**.

Freagair **gach ceann** de na **deich** gceist i **Roinn A**. Taifead do chuid freagraí tríd an litir chuí a mharcáil ar an leathán freagraí atá ar fáil. Ná húsáid ach na spásanna atá uimhrithe 1 go 10. Coinnigh an seiceamh agus tú ag freagairt na gceisteanna.

Freagair **gach ceann** de na **sé** cheist i **Roinn B**. Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo.

Don Scrúdaitheoir amháin	
Uimhir Ceiste	Marcanna
Roinn A	
1–10	
Roinn B	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

FAISNÉIS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 100 an marc iomlán don pháipéar seo.

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gceist **14(d)**.

Tá an marc céanna ag dul do na ceisteanna uilig i Roinn A,
.i. **dhá** mharc do gach ceist.

I Roinn B léiríonn na figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanach an marc atá ag dul do gach ceist nó do chuid de cheist.

Tá Tábla Peiriadach na nDúl (roinnt sonrai san áireamh) ar fáil.

Marc iomlán	

Roinn A

I gcás gach ceann de na ceisteanna seo a leanas níl ach **ceann amháin** de na freagraí litreach (A–D) ceart.


Roghnaigh an freagra ceart i ngach cás agus marcáil a chódlitir trí na poncanna a cheangal mar atá léirithe ar an leathán freagraí.

- 1 Cén ceann acu seo thíos a léiríonn adamh ina bhfuil líon na bprótón níos mó ná líon na neodrón?
 - A ^2H .
 - B ^3He .
 - C ^{10}B .
 - D ^{39}K .
- 2 Cén ceann acu seo a leanas ar cur síos ceart é ar thrasdulta leictreonacha i sraith thugtha sa speictream astúcháin adamhach de hidrigin?
 - A Tosaíonn siad uilig ón bhunstaid.
 - B Críochnaíonn siad uilig ag an bhunstaid.
 - C Tosaíonn siad uilig ó leibhéal fuinnimh ar leith.
 - D Críochnaíonn siad uilig ag leibhéal fuinnimh ar leith.
- 3 Cén ceann acu seo a leanas a liostaíonn na chéad fhuinnimh ianúcháin (ina kJ mol^{-1}) de na dúile maignéisiam, alúmanam, sileacan, fosfar agus sulfar san ord seo?

A	496	736	577	786	1060
B	577	786	1060	1000	1260
C	736	577	786	1060	1000
D	786	1060	1000	1260	1520





- 4 Anseo thíos tá an speictream maise de chlóirín móilíneach, Cl_2 . Tá buaic bhereise, nár chóir a bheith ann, i láthair sa speictream.

Cén ceann de na buaiceanna seo a leanas **nár** chóir a bheith i láthair?



- A 35
B 71
C 72
D 74
- 5 Leánn solad go gasta ag 100–101 °C. Ní sheolann sé leictreachas nuair atá sé leáite, fiú. Tuaslagann sé i dtuaslagóirí hidreacarbón. Cén ceann acu seo a leanas atá ag an solad?
- A struchtúr adamhach.
B struchtúr ollchomhfhíúsach.
C struchtúr ianach.
D struchtúr comhfhiúsach móilíneach.
- 6 Cén ceann de na hidrídí gásacha seo a leanas a dhianscaoileann go réidh ina dhúile nuair a thagann sé i dteagháil le slat the ghloine?
- A amónia
B fluairíd hidrigine
C iaidíd hidrigine
D gal

- 7 Is hidríd mhóilíneach d'arsanaic é airsín, AsH_3 , atá i nGrúpa V den Tábla Peiriadach. Cén ceann acu seo a leanas arb é struchtúr airsín é sa staid ghaile?



- 8 Cén ceann acu seo thíos a dhéanann 50 cm³ de 0.20 mol dm⁻³ d'aigéad sulfarach a neodrú go beacht?

- A 100 cm³ de 0.40 mol dm⁻³ de thuaslagán hidrocsaíd photaisiam.
- B 25 cm³ de 0.20 mol dm⁻³ de thuaslagán hidrocsaíd photaisiam.
- C 50 cm³ de 0.20 mol dm⁻³ de thuaslagán hidrocsaíd photaisiam.
- D 100 cm³ de 0.20 mol dm⁻³ de thuaslagán hidrocsaíd photaisiam.

- 9 Cén ceann acu seo thíos a léiríonn an líon leictreon a bhfuil an mhais chéanna acu, go neasach, is atá ag protón?

- A 20
- B 200
- C 2000
- D 20000

- 10 Cén ceann acu seo thíos nach ocsaíd pholach é?

- A CO
- B CO₂
- C H₂O
- D NO

Róinn B

Freagair **gach ceann** de na **sé** cheist sa roinn seo.

- 11 Tá dé-ocsaíd nítrigine, NO_2 , ar cheann de na comhbhaill i dtoitcheo fótaiceimiceach. Is é 305 kJ mol^{-1} an fuinneamh a bhíonn de dhíth leis an mhóilín seo a dhíthiomsú ina mhóilíní NO agus ina adaimh O. Úsáid na ceannteidil seo a leanas le minicíocht na radaíochta a bhíonn de dhíth don díthiomsú seo a ríomh.

- (a) Tiontaigh 305 kJ ina ghiúil

[1]

- (b) Ríomh an líon giúl a bhíonn de dhíth le móilín amháin de dhé-ocsaíd nítrigine a dhíthiomsú.

[1]

- (c) Úsáid an chothromóid $E = hf$ leis an luach i ngiúil a thiontú ina mhinicíocht agus luaigh na haonaid.

[1]

- 12 Is é an mianra beiril, $\text{Be}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{18}$, an phríomhfhoinse atá ann do bheirilliam.

Cé go bhfuil mianraí eile ann a bhfuil níos mó beirilliam iontu, tá siad gann agus costasach.

- (a) Ríomh an céatadán, de réir maise, de bheirilliam atá i mbeiril.

[3]

- (b) Faigtear an miotal beirilliam trí cheachtar acu meascán comhleáite de bheirilliam agus de chlóirídí potaisiam a leictrealú ag $350\text{ }^{\circ}\text{C}$ nó trí fhluiríd bheirilliam a dhí-ocsaídiú le maignéisiam.


- (i) Scríobh cothromóid le haghaidh foirmiú beirilliam ó iain bheirilliam.

[1]

- (ii) Scríobh cothromóid le haghaidh foirmiú beirilliam ó dhí-ocsaídiú fluairíd bheirilliam le maignéisiam.

[1]

- (c) De gnáth bíonn níos mó airónna sainiúla ag an chéad dúil i nGrúpa ná mar a bhíonn ag na dúile eile sa Ghrúpa. Is minic gurb é an difear i leictridhiúltachtaí is cúis leis seo. Anseo thíos tá luachanna leictridhiúltachta na ndúil i nGrúpa II.



- (i) Mínigh an chiall atá leis an téarma **leictridhiúltacht**.

[2]

- (ii) Agus leictridhiúltacht in úsáid, luaigh cad chuige ar móilín comhfhiúsach é clóiríd bheirilliam agus ar móilín ianach é clóiríd bhairiam.
-

[2]

- (iii) Luaigh **dhá** airí fhisiceacha a d'fhéadfaí a úsáid le hidirdhealú a dhéanamh idir an dá chlóiríd seo.
-

[2]

- (d) Is féidir clóiríd bheirilliam a ullmhú trí chlóirín nó chlóiríd hidrigine a imoibriú ar an mhiotal.

- (i) Scríobh an chothromóid d'imoibriú beirilliam le clóiríd hidrigine.
-

[1]

- (ii) Tarraing léaráid phoncanna agus chrois lena thaispeáint cad é mar a dhéantar clóiríd bheirilliam ó bheirilliam agus adaimh chlóirín. Ná húsáid ach na leictreoin sheachtracha de gach adamh.

[3]

- (iii) Luaigh riail an ochtréid.
-

[2]

- (iv) Is féidir a rá go gcomhlíonann clóiríd bheirilliam riail an ochtréid agus nach gcomhlíonann sé riail an ochtréid. Mínigh an bréagnú seo.
-

[2]

(v) Tarraing an cruth atá ar mhóilín clóiríd bheirilliam.

Scrúdaitheoir Amháin

Marcanna Athmharc

[1]

(vi) Luaigh an cruth atá ar an mhóilín clóiríd bheirilliam.

[1]

(vii) Mínigh an cruth atá ar an mhóilín clóiríd bheirilliam.

[2]

- 13 Déanann clóirín sraith d'oscaídí. Tá cuid de na hocsáidí luaite anseo thíos.

aonocsaíd chlóirín Cl_2O

dé-ocsaíd chlóirín ClO_2

heicsocsaíd chlóirín Cl_2O_6


heaptocsaíd chlóirín Cl_2O_7

- (a) Úsáid uimhir ocsáidiúcháin clóirín leis an ainm córasach a fháil do heaptocsaíd chlóirín.

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

[1]

- (b) Tuaslagann dé-ocsaíd chlóirín in uisce agus déantar tuaslagán a dhéanfaidh meascán d'aigéad clórach agus d'aigéid hidreaclóracha ar deireadh.



Na hadaimh chlóirín i ndé-ocsaíd chlóirín, tarlaíonn díréiriúchán dóibh san imoibriú seo.

- (i) Mínigh an chiall atá leis an téarma **díréiriúchán**.

[1]

- (ii) Ríomh uimhir ocsáidiúcháin clóirín in imobreán agus i dtáirgí an imoibrithe seo agus úsáid iad lena dheimhniú gur imoibriú díréiriúchán é an t-imoibriú.

[3]

(c) Tuaslagann gás clóirín in uisce sa mhéid go dtuaslagfaidh 0.8 g in 100 cm³ ag brú an atmaisféir agus 20 °C.

(i) Ríomh molaracht an uisce chlóirín, Cl₂ (aq), a tháirgtear.

 [2]

(ii) Ainmnigh tuaslagóir eile a dtuaslagfaidh clóirín go réidh ann.

 [1]

Scrúdaitheoir Amháin	Marcanna	Athmharc

- 14 Cuireadh turgnamh i dtreoir le fiosrú a dhéanamh ar imoibrithe díláithriúcháin na hailiginí.

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

Uillmhaíodh tuaslagáin de hailídí sóidiam agus rinneadh iad a imoibriú le hailiginí eile. Tá tábla na dtorthaí anseo thíos.

	iaidíd sóidiam (aq)	bróimíd sóidiam (aq)	clóiríd sóidiam (aq)
tuaslagán iaidín		X	X
tuaslagán bróimín	✓		
tuaslagán clóirín			

✓ cuireann sé in iúl go raibh imoibriú ann

X cuireann sé in iúl nach raibh imoibriú ann

- (a) Comhlánaigh na 3 áit atá fágtha sa tábla. [2]

- (b) (i) Tá an tuaslagán bróimín agus an tuaslagán iaidín araon daite. Cuir síos ar na breathnuithe a chuirfeadh in iúl go raibh imoibriú ann nuair a cuireadh iaidíd sóidiam uiscí le tuaslagán bróimín.

[2]

- (ii) Scríobh an chothromóid ianach don imoibriú idir tuaslagán bróimín agus iaidíd sóidiam uiscí.

[1]

- (c) (i) Cuir síos ar a mbíonn le feiceáil nuair a chuirtear tuaslagán clóirín le bróimíd sóidiam uiscí.

[2]

- (ii) Scríobh an chothromóid don imoibriú idir tuaslagán clóirín agus bróimíd sóidiam uiscí.

[1]

- (d) Abair gur dhoirt tú tuaslagán d'iaidíd sóidiam, de bhróimíd sóidiam agus de chlóiríd sóidiam isteach in eascraí A, B agus C agus go ndearna tú dearmad iad a lipéadú. Cuir síos ar an dóigh, agus níotráit airgid uiscí agus tuaslagán caol amónia agus tuaslagán tiubhaithe amónia araon in úsáid agat, a mbeadh a fhios agat cén salann sóidiam a bhí i ngach ceann de na heascraí. Caithfear gach ceann de na heascraí a thástáil.

Scrúdaitheoir Amháin	Marcanna	Athmharc


Caijhdeán na cumarsáide scríofa

[2]

- 15 Anseo thíos tá struchtúr oighir. Tá na móilíní uisce á gcoinneáil le chéile ag naisc hidrigine ar cineál fórsa idirmhólíneach iad.

Scrúdaitheoir Amháin

Marcanna Athmharc



- (a) Ainmnigh **dhá** chineál eile d'fhórsa idirmhólíneach.

[2]

- (b) (i) Mínigh an dóigh a dtarlaíonn nascadh hidrigine idir na móilíní uisce in oighear.

[2]

- (ii) Mínigh, agus an struchtúr thusa in úsáid agat, cad chuige nach bhfuil oighear chomh dlúth céanna le huisce.

[2]

- (c) Cé go dtig le huisce naisc hidrigine a dhéanamh, ní dhéanann sé slabhraí fada de “phol-uisce” ag teocht an tseomra. Sa staid leachtach, áfach, déanann móilíní, amhail fluairíd hidrigine, slabhraí iontach gairid. Luagh cad chuige nach ndéanann uisce slabhraí nuair a dhéanann fluairíd hidrigine leachtach slabhraí.

[2]

- (d) Is substaint eile é amónia a thig leis naisc hidrigine a dhéanamh.
Tá struchtúr pirimidiúil ag amónia, áfach.

(i) Tarraing dhá mhóilín amónia agus taispeán an nasc hidrigine idir an dá mhóilín.

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

[2]

(ii) Nuair a imoibríonn amónia le hian hidrigine ní bhíonn sé ábalta naisc hidrigine a dhéanamh níos mó. Mínigh cad chuige.

[1]

- (e) Mínigh cad chuige a bhfuil amónia iontach intuaslagtha in uisce.

[2]

- 16** Tá litiam ann sa dulra mar dhá iseatóp ^6Li agus ^7Li . Taispeánann an tábla seo thíos comhdhéanamh litiam i ndúlra.

iseatóp	% flúirse
litiam 6	7.42
litiam 7	92.58

- (a) Tarraing an struchtúr atá ar adamh ^7Li agus lipéadaigh na cáithní Bí-fo-adamhacha uilig.

[3]

- (b) Luagh agus mínígh cé acu de na bloic s, p nó d'lena mbaineann litiam.

[2]

- (c) Ríomh mais adamhach choibhneasta litiam ceart go dtí dhá ionad de dheachúlacha.

[3]

- (d) Tuaslagann sulfait litiam go réidh in uisce agus criostalaíonn sé ón tuaslagán mar hidráit.

(i) Mínigh an chiall atá leis an téarma **uisce criostalúcháin**.

[1]

(ii) Scríobh an fhoirmle do shulfait litiam ainhidriúil.

[1]

(iii) Ríomh an fhoirmle do shulfait litiam hidráitithe má tháirgeann 3.76 g den salann litiam hidráitithe 3.23 g de shulfait litiam ainhidriúil arna théamh.

[3]

- (e) Is féidir sulfait litiam a úsáid i dtástáil lasrach. Mínigh an dóigh a ndéanfaí tástáil lasrach agus luaigh an dath a mbeifí ag súil leis a bheith ar an lasair.

[4]

SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR

Scrúdaitheoir Amháin	Marcanna	Athmharc

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh
sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.