



ADVANCED
General Certificate of Education
January 2012

Uimhir Lárionaid

71

Uimhir larrthóra

Ceimic
Aonad Measúnaithe A2 1
ag measúnú
Treochtaí Peiriadacha agus Ceimic Orgánach,
Fhisiceach agus Neamhorgánach Bhreise
[AC212]



DÉARDAOIN 26 EANÁIR, IARNÓIN

AM

2 uair an chloig.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir larrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Freagair **gach ceann** de na **sé** cheist **déag**.

Freagair **gach ceann** de na **deich** gceist i **Roinn A**. Taifead do chuid freagraí tríd an litir chuí a mharcáil ar an leathán freagraí atá ar fáil.

Ná húsáid ach na spásanna atá uimhrithe 1 go 10. Coinnigh an seicheamh agus tú ag freagairt na gceisteanna.

Freagair **gach ceann** de na **sé** cheist i **Roinn B**. Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo.

Don Scrúdaitheoir	
Amháin	
Uimhir	Marcanna
Ceiste	
Roinn A	
1–10	
Roinn B	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

FAISNÉIS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 120 an marc iomlán don pháipéar seo.

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gceist **15(e)**.

Tá an marc céanna ag dul do na ceisteanna uilig i Roinn A, i.e. **dhá** mharc do gach ceist.

I Roinn B léiríonn na figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deisce de leathanach an marc atá ag dul do gach ceist nó do chuid de cheist.

Tá Tábla Peiriadach na nDúl (roinnt sonraí san áireamh) ar fáil.

Marc	
iomlán	

Roinn A


I gcás gach ceann de na ceisteanna seo a leanas níl ach **ceann amháin** de na freagraí litreach (A–D) ceart.

Roghnaigh an freagra ceart i ngach cás agus marcáil a chódlitir trí na poncanna a cheangal mar atá léirithe ar an leathán freagraí.

- 1 Cén ceann de na comhdhúile seo a leanas atá gníomhach go hoptúil agus nach féidir léi tuaslagán Fehling a dhí-ocsaídiú?
 - A $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CHO}$
 - B $\text{CH}_3\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{COCH}_3$
 - C $\text{CH}_3\text{CHClCH}_2\text{CHO}$
 - D $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{COCH}_3$
- 2 Cé acu Grúpa anseo thíos a dtáirgfeadh na dúile ann an méid is mó fuinneamh nuair a chuirtear leictreon le hadamh leithlisithe?
 - A Grúpa I.
 - B Grúpa III.
 - C Grúpa VII.
 - D Grúpa VIII.
- 3 Cén ceann de na ráitis seo a leanas faoin imoibriú chun tosaigh agus faoin imoibriú ar gcúl don imoibriú
$$\text{Q} + \text{R} \rightleftharpoons \text{S} + \text{T}$$
atá ceart nuair atá an córas i gcothromáiocht?
 - A Is ionann an cóimheas idir ráta an imoibrithe ar gcúl agus ráta an imoibrithe chun tosaigh agus an tairiseach cothromáiochta
 - B Is ionann ráta an imoibrithe ar gcúl agus ráta an imoibrithe chun tosaigh agus níalas
 - C Is mar an gcéanna iad ráta an imoibrithe ar gcúl agus ráta an imoibrithe chun tosaigh
 - D Is mar an gcéanna iad an rátathairiseach don imoibriú ar gcúl agus an rátathairiseach don imoibriú chun tosaigh
- 4 Cé acu ceann de na hocsáídí seo a leanas a bhfuil struchtúr comhfhiúsach móilíneach aici?
 - A Al_2O_3
 - B Cl_2O_7
 - C MgO
 - D Na_2O

- 5 Táirge criostalach flannbhúí dar 2,4-déníotrofheinilhiodraisín a thugtar ag comhdhúil orgánach ach ní thugann an chomhdhúil scáthán airgid le himoibrí Tollen. Cén ceann de na móilíní seo a leanas arb é an chomhdhúil orgánach é.
- A próipianáit eitle
 B meatánal
 C própánón
 D aigéad própánóch
- 6 Imoibríonn eatán le clóirín agus foirmítear clóro-chomhdhúile ionadacha éagsúla sa raon ó C_2H_5Cl go dtí C_2Cl_6 . Cén ceann acu seo a leanas arb é an líon é de na comhdhúile atá gníomhach go hoptúil a fhoirmítear?
- A 0
 B 1
 C 2
 D 4
- 7 Sa chothromaíocht idir nítrigin agus hidrigin le hamóinia a fhoirmiú,
- $$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$$
- fuarthas na páirtbhrúnna seo a leanas.
- | | nítrigin | hidrigin | amóinia |
|-----------------------|----------|----------|---------|
| Páirtbhrú coibhneasta | 1 | 9 | 1 |
- Cén ceann acu seo a leanas arb é an luach uimhriúil é den tairiseach cothromaíochta, K_p ?
- A 1/729
 B 1/9
 C 9
 D 729

8 Cén ceann de na graif seo thíos ar imoibriú den chéad ord é?



9 Cén ceann acu seo a leanas a mbíonn aonaid i gcónaí aige?

- A K_c
- B K_d
- C K_p
- D K_w

10 Anseo thíos tá an rátachothromóid don imoibriú idir própánón agus iaidín i dtuaslagán aigéadach:

$$\text{ráta} = k[\text{CH}_3\text{COCH}_3][\text{H}^+]$$

Cén ceann acu seo a leanas a sheasann d'aonaid k ?

- A $\text{mol dm}^{-3}\text{s}^{-1}$
- B $\text{mol}^{-1}\text{dm}^3\text{s}^{-1}$
- C $\text{mol}^2\text{dm}^{-6}\text{s}^{-1}$
- D $\text{mol}^{-2}\text{dm}^6\text{s}^{-1}$


LEATHANACH BÁN

(Leanann na ceisteanna ar an chéad leathanach eile)

Roinn B

Freagair gach ceann de na sé cheist sa roinn seo.

- 11 Tá foirmiú carbónait amóinia á fhiosrú mar mhodh a d'fhéadfaí a úsáid le dé-ocsaíd charbón a bhaint amach as próisis dócháin.



- (a) (i) Anseo thíos tá na cainníochtaí teirmidinimiciúla a bhaineann leis an imoibriú seo:

$$\Delta G = -25 \text{ kJ mol}^{-1}; \Delta H = -170 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$S(\text{CO}_2) = +214 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

$$S(\text{H}_2\text{O}) = +70 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

$$S((\text{NH}_4)_2\text{CO}_3) = +220 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

$$S(\text{NH}_3) = +192 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

Bain úsáid as na sonraí a thugtar lena fháil amach cad é an teocht faoina mbíonn an dé-ocsaíd charbón á baint amach.

[3]

- (ii) Is é 2.5×10^4 an tairiseach cothromaíochta don imoibriú ar 20°C .
Is é 0.12 an tairiseach cothromaíochta don imoibriú ar 80°C .
Mínigh an fáth leis an laghdú ar luach K agus luaigh an éifeacht a bheadh aige seo ar bhaint amach CO_2 .

[2]

- (b) Tarlaíonn imoibriú spontáineach do carbónait amóinia nuair a chuirtear le haigéad eatánóch í agus tárgtear toirteanna ollmhóra gáis agus bíonn laghdú suntasach ar an teocht.

- (i) Scríobh an chothromóid don imoibriú.

[1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

(ii) Cad é a chiallaíonn an téarma imoibriú **spontáineach**?

[1]

Scrúdaitheoir Amháin

Marcanna Athmharc

(iii) Cad chuige ar chóir don imoibriú seo leanúint ar aghaidh nuair is imoibriú inteirmeach é?

[1]

(c) Nuair a mheasctar eatánóait amónia le haigéad eatánóch is féidir an meascán a úsáid mar thuaslagán maolánach.

(i) Bain úsáid as cothromóid lena thaispeáint cad é mar a bhaineann an tuaslagán maolánach iain hidrigine bhreise amach.

[1]

(ii) Bain úsáid as cothromóid lena thaispeáint cad é mar a bhaineann an tuaslagán maolánach iain hidrocsaíde bhreise amach.

[1]

(d) Nuair a dhéantar eatánóait amónia sholadach a théamh, díthiomsaíonn sí agus foirmítear na bun-imoibreáin.

(i) Scríobh cothromóid chothromaíochta, agus na siombailí staide san áireamh inti, don díthiomsú.

[2]

(ii) Mínigh cad chuige a gcuirfear cosc ar an díthiomsú nuair a dhéantar eatánóait amónia a théamh le haigéad eatánóch.

[2]

- 12 Is leacht éadathach é aigéad piorúvach agus é ar fiuchadh ar 165 °C (agus beagán dianscaolte ann) agus tá an boladh uaidh cosúil leis an bholadh ó aigéad eatánóch.


Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc



aigéad piorúvach

Baintear úsáid as go leor modhanna le haigéad piorúvach a ullmhú.

- (a) Nuair a dhéantar aigéad tartarach a théamh le hidriginsulfait photaisiam foirmítear aigéad piorúvach. Tuigtear go dtarlaíonn an t-imoibriú trí fhoirmiú aigéid hidrocsamhailéach (struchtúr I) a athchóiríonn ina aigéad ocsalaicéiteach (struchtúr II).



aigéad tartarach I II aigéad piorúvach

- (i) Cá mhéad lár neamhshiméadrach atá ann in aigéad tartarach?

_____ [1]

- (ii) Tá struchtúr I ann i struchtúr E agus struchtúr Z. Tarraing na struchtúir agus lipéadaigh E agus Z iad.

[3]

- (iii) Baineann **dícharbocsailiú** leis an chéim dheiridh sa tsintéis. Cén míniú, dar leat, atá ar an téarma seo?

_____ [1]

- (b) Le haigéad piorúvach a ullmhú ar dhóigh eile, is féidir ocsaíd airgid, ar fuaidreamh in uisce, a úsáid le haigéad lachtach, $\text{CH}_3\text{CHOHCOOH}$, a ocsaídiú.

(i) Cad é foirmle ocsaíd airgid?

_____ [1]

(ii) Scríobh an chothromóid le haghaidh foirmiú aigéid phiorúvaigh ó aigéad lachtach agus bain úsáid as [O] le bheith ina shiombail ar an oibreán ocsaídiúcháin.

_____ [1]

- (c) Is modh sintéise eile í an tsreabhscéim seo thíos.



Cad é ainm imoibrí A agus imoibrí B, dar leat?

A _____ [1]

B _____ [1]


- (d) Le haigéad piorúvach a ullmhú ar dhóigh eile, is féidir aigéad 2,2-débhrómphrópánóch a hidrealú le huisce. Scríobh sreabhscéim don imoibriú agus taispeáin an chomhdhúil dhéhidreocsa idirmheánach.

[2]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- (e) Léiríonn aigéad piorúvach an dá cheann acu, imoibriú céatóin agus imoibriú aigéid charbocsailigh. Comhlánaigh na sreabhsheichimh seo thíos agus taispeán an táirge orgánach i ngach cás.

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc



- (f) Is aigéad measartha láidir é aigéad piorúvach agus is é 0.56 an tairiseach díthiomsúcháin aigéid atá aige. Tá sé inmheasctha in uisce chomh maith.

- (i) Scríobh an slonn don tairiseach díthiomsúcháin aigéid d'aigéad piorúvach.

[1]

- (ii) Ríomh an pH le haghaidh tuaslagán 0.25 M d'aigéad piorúvach.

[3]

- (iii) Cad é a chialláíonn an téarma **inmheasctha**, dar leat?

[1]

- (iv) Cad chuige, dar leat, a bhfuil aigéad piorúvach inmheasctha in uisce?


[2]

LEATHANACH BÁN

(Leanann na ceisteanna ar an chéad leathanach eile)

- 13 Tá go leor dóigheanna difriúla ann le timthriall Born-Haber a scríobh.
Léirítear ceann amháin de na dóigheanna seo anseo thíos.

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc



Anseo thíos tá luachanna na dtéarmaí a léirítear sa scéim:

$$\begin{aligned}\Delta H_f &= -602 \text{ kJ mol}^{-1} \\ \Delta H_{\text{diss}} &= +498 \text{ kJ mol}^{-1} \\ \Delta H_{\text{atom}} &= +148 \text{ kJ mol}^{-1} \\ I_{\text{Mg}} &= +2189 \text{ kJ mol}^{-1} \\ E_o &= +657 \text{ kJ mol}^{-1}\end{aligned}$$

- (a) Mínigh an chiall atá le gach ceann de na téarmaí seo a leanas.

(i) ΔH_{diss}

_____ [1]

(ii) ΔH_{atom}

_____ [1]

(iii) I_{Mg}

_____ [1]

- (b) (i) Ríomh luach U le haghaidh ocsáid mhaignéisiam.

[2]

- (ii) Agus timthriall Born-Haber in úsáid agat, mínigh cad chuige a bhfuil ocsáid mhaignéisiam iontach cobhsaí.

[2]

- (c) Mínigh cad chuige nach féidir timthriall Born-Haber a thógáil le haghaidh ocsáid fosfair(V).

[1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

14 Nuair a bhíonn sulfar ag dó in aer foirmítear dé-ocsaíd sulfair agus cuid bheag de thrí-ocsaíd sulfair. Is í an trí-ocsaíd sulfair atá ina cúis leis an chuma cheomhar a bhíonn ar an dé-ocsaíd sulfair.

- (a) Scríobh cothromóidí don imoibriú idir sulfar agus ocsaigin le dé-ocsaíd sulfair agus trí-ocsaíd sulfair a dhéanamh.

(i) dé-ocsaíd sulfair

_____ [1]

(ii) trí-ocsaíd sulfair

_____ [1]

- (b) Tuaslagann dé-ocsaíd sulfair agus trí-ocsaíd sulfair in uisce agus foirmítear aigéad sulfarúil agus aigéad sulfarach. Scríobh cothromóidí do na himoibrithe.

(i) dé-ocsaíd sulfair

_____ [1]

(ii) trí-ocsaíd sulfair

_____ [1]

- (c) Imoibríonn an dá aigéad seo le hidrocsaíd sóidiam agus foirmítear salainn sóidiam.

Tuaslagann na salainn seo in uisce agus táirgtear tuaslagán dar pH difriúil.

Scríobh na cothromóidí don imoibriú idir aigéad sulfarúil agus farasbarr hidrocsaíd sóidiam agus don imoibriú idir aigéad sulfarach agus farasbarr hidrocsaíd sóidiam leis na salainn sóidiam a tháirgeadh.

(i) aigéad sulfarúil

_____ [1]

(ii) aigéad sulfarach


_____ [1]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

- (d) Mínigh cad chuige a bhfuil pH de 9 ag tuaslagán sáithithe de shuilfít sóidiam agus a bhfuil pH de 7 ag sulfait sóidiam.

[3]

- (e) Anseo thíos tá cuair thoirtmheasctha don imoibriú idir aigéad sulfarach agus farasbarr hidrocsaíd sóidiam.



- (i) Mínigh cad chuige a bhfuil an fad de chodanna ceartingearacha na gcuar ag laghdú de réir mar atá na tiúchain aigéid ag laghdú.

[1]

- (ii) Mínigh cad é mar a roghnófá táscaire fóirsteanach le haghaidh toirtmheascadh 0.001 M d'aigéad sulfarach le 0.001 M de NaOH.

[2]

- (f) Ag an phointe deiridh nuair a chuirtear 0.1 cm^3 de hidrocsaíd sóidiam 2M le tuaslagán d'aigéad sulfarach 1M bíonn athrú suntasach ar an pH. Taispeánann an tábla seo thíos na hathruithe ar pH.

toirt aigéid shulfaraigh/cm³	toirt tuaslagán hidrocsaíd sóidiam a cuireadh leis/cm³	pH an tuaslagáin
100	99.9	
100	100.0	7.0

Ríomh pH an tuaslagáin atá ar iarraidh sa tábla thusa.

[3]





Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

LEATHANACH BÁN

(Leanann na ceisteanna ar an chéad leathanach eile)

- 15 Anseo thíos tá cuid de na gnáth-aigéid shailleacha neamhsháithithe a bhíonn in olaí agus i saillte. Is naisc *cis* iad formhór mór na nasc neamhsháithithe seo.

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc



- (a) Mínigh cé acu de na haigéid seo ar aigéid monai-neamhsháithithe iad agus cé acu ar aigéid pholai-neamhsháithithe iad.

[2]

- (b) Is naisc *cis* iad na naisc dhúbalte uilig in aigéad araiciseonaic.
Tarraing struchtúr an aigéid.

[2]

- (c) Scríobh an chothromóid don imoibriú idir aigéad oiléach agus iaidín móilíneach.

[2]

- (d) (i) Is féidir an luach iaidín d'aigéad sailleach a fháil. Sainmhínigh an téarma **luach iaidín**.

[2]

- (ii) Ríomh an luach iaidín d'aigéad líonóiléineach.

[4]

- (iii) Luaigh agus mínígh cé acu ceann de na haigéid a bhfuil an luach iaidín is mó aige.

[2]

- (e) Mínígh an méid a chuireann olaí nó sailtte polai-neamhsháithithe leis an aiste bia.

[4]

Caighdeán na cumarsáide scriofa

[2]


- (f) Is féidir na haigéid uilig seo a hidriginíú go catalaíoch ar an dóigh chéanna le holaí agus sailtte. Ainmnigh an catalaíoch agus luaigh na coinníollacha faoina ndéantar é.

[3]

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

16 Imoibríonn eatáнал le ciainíd hidrigine agus foirmítear cianaihidrin

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc



- (a) Is é an t-imoibriú idir an t-ian ciainíde agus an grúpa carbóinile an chéad chéim agus foirmítear idirmheánach. Is é seo an chéim rátachinntitheach.

(i) Tarraing struchtúr an idirmheánaigh.

[1]

(ii) Cad é a chiallaíonn an téarma **céim rátachinntitheach?**

[1]

(iii) Scríobh an rátachothromóid agus luaigh an chiall atá leis an tsiomайл k.

[2]

(iv) Cad é ord an imoibrithe?

[1]

(b) Is é prótónáitiú an idirmheánaigh an dara céim.

- (i) Scríobh an chothromóid don chéim seo a bhfuil an t-imoibriú idir ciainíd hidrigine agus an t-idirmheánach inti.

Scrúdaitheoir Amháin	
Marcanna	Athmharc

[2]

- (ii) Mínigh cé acu mall nó gasta a bheadh an chéim seo.

[2]

(c) Cad chuige, dar leat, a dtaispeánann an chothromóid seo go bhféadfaí an t-ian ciainíde a mheas mar chatalaíoch i dtaca le foirmiú cianaihidrine de?

[1]

(d) Fágann struchtúr an idirmheánaigh sa mheicníocht go dtáirgtear táirge atá neamhghníomhach go hoptúil.

- (i) Cad é a chiallaíonn an téarma **neamhghníomhach go hoptúil?**

[2]

- (ii) Tarraing na struchtúir 3T den dá tháirge cianaihidrine.

[2]

- (iii) Mínigh cad chuige a bhfuil an táirge cianaihidrine neamhghníomhach go hoptúil.

[2]

SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh
sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.